

((Back cover))

((Front cover))

Empfängnisverhütung

PK-1419-1420-0317-01-APL
P1417333

Wenden Sie zurzeit Verhütungsmittel an?

ja nein

Falls ja, notieren Sie bitte hier die Bezeichnungen:

[Redacted area for contraceptive names]

Nehmen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit, sie/er wird Sie informieren, ob Sie zusätzliche oder andere Verhütungsmethoden benötigen.

Patientenkarte mit Warnhinweisen

Wichtige Warnhinweise zur Anwendungssicherheit für Patienten, die Bosentan PUREN einnehmen

Diese Karte enthält wichtige Information zu Bosentan PUREN. Bitte lesen Sie diese Karte sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme von Bosentan PUREN beginnen.

Ihr Name: [Redacted]

Behandelnder Arzt: [Redacted]

Wenn Sie Fragen zu Bosentan PUREN haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

PUREN Pharma GmbH & Co. KG



((Inside-1))

((Inside-2))

Wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter sind, lesen Sie diese Karte bitte sehr sorgfältig

Schwangerschaft

Bosentan PUREN kann schädliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Feten haben. Daher dürfen Sie Bosentan PUREN nicht einnehmen, wenn Sie schwanger sind. Sie dürfen während der Behandlung mit Bosentan PUREN auch nicht schwanger werden. Darüber hinaus kann es, wenn Sie an pulmonaler Hypertonie leiden, bei einer Schwangerschaft zu einer schwerwiegenden Verschlechterung Ihrer Krankheitssymptome kommen. Falls Sie vermuten, dass Sie schwanger sind, informieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt oder Gynäkologen.

Empfängnisverhütung

Eine Verhütung basierend auf Hormonen – wie orale Verhütungsmittel und Antibabypillen, Hormonspritzen, Implantate oder Verhütungspflaster, ist keine zuverlässige Methode, um eine Schwangerschaft bei mit Bosentan PUREN behandelten Frauen zu verhindern. Sie müssen Barriere-Methoden – wie ein Kondom für die Frau, Diaphragma oder einen Verhütungs-Schwamm – zusätzlich zu irgendeinem dieser hormonalen Verhütungsmittel anwenden. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle Ihre Fragen mit Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen besprechen – füllen Sie bitte die Rückseite dieser Karte aus und bringen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit. Bei Ihnen sollte ein Schwangerschaftstest vor Beginn der Bosentan PUREN-Therapie und monatlich während der Behandlung durchgeführt werden, auch wenn Sie glauben, dass Sie nicht schwanger sind.

Datum des ersten monatlichen Schwangerschaftstests: [Redacted]

Blutuntersuchung zur Leberfunktion

Bei einigen Patienten, die Bosentan PUREN eingenommen haben, wurden veränderte Leberfunktionswerte festgestellt. Während der Behandlung mit Bosentan PUREN wird Ihr Arzt Termine für regelmäßige Blutuntersuchungen ansetzen. Dabei wird überprüft, ob Veränderungen Ihrer Leberfunktion aufgetreten sind.

**Denken Sie an die monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion.
Nach einer Dosiserhöhung wird ein zusätzlicher Test nach 2 Wochen durchgeführt.**

Datum des ersten monatlichen Tests: [Redacted]

Termine für Ihre monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion:

Jan	[Redacted]	Mai	[Redacted]	Sep	[Redacted]
Feb	[Redacted]	Juni	[Redacted]	Okt	[Redacted]
März	[Redacted]	Juli	[Redacted]	Nov	[Redacted]
April	[Redacted]	Aug	[Redacted]	Dez	[Redacted]